

Goliath® Gel

UPUTA ZA PRIMJENU:

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Goliath®Gel je insekticidni gel za profesionalnu upotrebu, namjena biocidnog pripravka Goliath®Gel jest suzbijanje žohara (*Blattella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blattella orientalis* ...) u unutranjim prostorima, na primjer u kućnim prostorijama (uključujući kuhinje), u industrijskim prostorijama, kao što su prostorije za preradu i proizvodnju hrane, skladištenje hrane i pripremu hrane, komercijalne kuhinje, restorani, trgovine hranom, tvornice, prodavaonice, radionice, zrakoplovi, vozila, željeznička i brodovska skladišta, prostori javnoga zdravstva, komunalne higijene i veterinarsva i javni objekti kao što su hotelli, bolnice, zatvori, kazališta, skladišta, prodajna mjesta i sl.

Žohar uglavnog ugiba nekoliko sati nakon što je konzumirao Goliath®Gel. U infestiranim prostorijama mrtvi žohari obično će se vidjeti u roku od 24 sata od apliciranja.

Zohar će običajno poginuti nekoliko sati nakon što je konzumirao Goliath Gel. U infestiranim prostorijama mrtvi žohari obično će se vidjeti u roku od 24 sata od apliciranja.

Tretirane površine potrebno je ponovno pregledati nakon 1-2 tjedna. Na mestima gde se ponovo pojave žohari treba ponovo aplicirati Goliath®Gel. Goliath®Gel potrebno je aplicirati sve dok se žohari pojavljuju 1-2 tjedna nakon aplikacije.

Način aplikacije:

Za optimalne rezultate preporučuje se da se prije dezinfekcije biocidnim pripravkom Goliath®Gel napravi pregled prostora kako bi se utvrdio stupanj infekcije i odredile kritične točke.

Kritične točke obično se nalaze blizu sudopera, vodovoda, odvoda, električnih kućanskih aparata (hladnjaci, računala), u neposrednoj blizini otpada te na svim tamnim i vlažnim mjestima.

Za određivanje kritičnih točaka u prostorije se na mjestima gdje se očekuje pojav žohara polažu mamci za monitoring. Natemelju informacija dobivenih monitoringom donosi se odluka o nacinu dezinfekcije.

Goliath®Gel ulošci dizajnirani su za uporabu BaitGunom® ili sličnim aplikatorom visoke preciznosti. Uložak Goliath®Gel potrebno je zaključati u BaitGun®pištoli i dodati odgovarajući tip aplikatora. Procitajte upute proizvođača o korištenju BaitGuna®.

Za dobru djelotvornost je Goliath®Gel treba aplicirati u obliku kapljica na mjesto infekcije. Nježnim pritiskom na pištoli postižnemo da se na mjesto infekcije (kritične točke) aplicira kap promjera 3-4 mm, težine 0,03g. U slučaju, da Goliath®Gel aplicirate na pogrešnom mjestu, aplicirani gel temeljito očistite vlažnim papirnatim ručnikom. Nakon toga ručnik bacite u kućanski otpad.

Goliath®Gel je djelotvorniji ako na mesta infekcije aplicirate više manjih nego jednu veliku kap. Goliath®Gel je djelotvorniji ako ga apliciramo na suha mesta, bez prašine i mesta gdje nisu bili aplicirani drugi insekticidi. Ako Goliath®Gel stavite na vlažna, prašna mesta i mesta gdje su već aplicirani drugi insekticidi, smanjite njegovo djelovanje.

Doziranje:

U slučajevima ponovne infestacije i na područjima koja su posebno priljava ili pretrpana ili gdje alternativne izvore hrane ne možete u potpunosti eliminirati, upotrijebite doziranje za visoku infestaciju.

Kod normalne infestacije aplicirajte na kritičnu točku 0,03 g biocidnog pripravka Goliath®Gel / m², cca jedna kap gela.

Kod visoke infestacije žohara (*Blattella germanica*) aplicirajte na kritičnu točku 0,06 g biocidnog pripravka Goliath®Gel / m² cca dvije kapi gela.

Kod visoke infestacije žohara (*Blattella germanica* i *Periplaneta americana* aplicirajte) na kritičnu točku 0,09 g biocidnog pripravka Goliath®Gel / m², cca tri kapi gela.

UPUTE ZA SIGURAN RAD:

Upute za uporabu i doziranje: mamci su pripremljeni za neposrednu primjenu

Zaštita: zaštitne rukavice (HRN EN 374) od nitrilnog kaučuka (0,4 mm), kloroprenskog kaučuka (0,5 mm), polivinilklorida (0,7 mm), itd. Zaštitne naočale s bočnim štitnicima (HRN EN 166). Zaštitu tijela izabrati ovisno o vrsti rada i mogućim utjecajima, npr. pregača, zaštitna obuća (HRN EN 13832), zaštitno pamučno odijelo (HRN EN 340).

Ne jesti, piti niti pušti u vrijeme rada s proizvodom. Prati ruke prije pauza i po završetku posla.

Opasnost i učinici proizvoda: Kod propisnog skladištenja i rukovanja nisu potrebne posebne mjere opreza. Koristiti zaštitnu opremu.

Prva pomoć i liječenje:

Izbjegavati dodir s kožom, očima, odjećom. Odmah ukloniti onečišćenu odjeću. Kod tegoba: potražiti liječnika. Omot, naljepnicu i/ili Sigurnosno-tehnički list pokazati liječniku.

Udisanje: Svežež zrak, mirovanje, liječnička pomoć ako se pojave i zadrže neki simptomi.

Kontaminirana koža: Ukloniti kontaminiranu odjeću i obuću. Odmah isprati vodom i blagom sapunicom. Ukoliko se pojave i zadrže bilo kakvi simptomi, potražiti liječničku pomoć

U slučaju kontakt s očima: Ukloniti kontaktne leće ako je to moguće. Čistim prstima pridržati kapke te laganim mlazom, po mogućnosti tople vode, ispirati svako oko naizmjenično 15-ak minuta, te ukoliko se nakon toga pojave i zadrže bilo kakvi simptomi, potražiti pomoć očnog liječnika.

Kod gutanja: Ne izazivati povraćanje. Odmah isprati usta vodom, popiti 2,5-3 dl vode, potražiti liječnika. Nikad ne uzeti nešto na usta ako je ozlijedena osoba bez svijesti ili ima grčeve.

U svim slučajevima lošeg osjećanja pri radu potražite liječničku pomoć i pokažite uputu za siguran rad ili Sigurnosno-tehnički list.

Prototrov: Nije poznat

MJERE SIGURNOSTI KOD NESREĆE:

Rasuto sredstvo: Upotrijebiti zaštitnu opremu. Izbjegavati dodir s kožom, očima, odjećom. Ne dopustiti da dospije u zemlju. Ne ispušta u kanalizaciju/površinske vode/podzemne vode. Rasuto sredstvo pokupiti pogodnim upojnim materijalom (pijesak, piljevina, vezivo opće namjene) u prikladne, označene spremnike koji se mogu čvrsto zatvoriti. Sakupljene otpatke predati pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada. Onečišćene predmete i pod temeljito očistiti vodom i deterđentima uz poštovanje ekoloških propisa.

Ako je prostor zahvatio požar: nositi samostalni uređaj za disanje sa stlačenim zrakom (HRN EN 137) i vatrootporno odijelo. **Za gašenje požara koristiti:** ugljikov dioksid, suha sredstva za gašenje, vodenu maglicu, pjenu.

SKLADIŠTENJE:

Držati u originalnim spremnicima, odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Čuvati od topline. Štititi od vlage. Čuvati od direktnog utjecaja sunca. Čuvati na temperaturu do 30°C. Ako se pripravak duže vrijeme skladišti iznad navedene temperature, mogu nastati promjene u svojstvima pripravka.

UNISTAVANJE NEUPOTRIJEUBLJENIH KOLIČINA PRIPRAVKA I

AMBALAŽE: zaostalo sredstvo u ambalaži utrošiti pri radu, a onečišćenu ambalažu vratiti pravnoj osobi koja je proizvod stavila u promet. Nikada ne koristiti ambalažu za druge svrhe. Ne prosipati ostatke sredstva niti bacati ambalažu u tekuće vode, rijeke i more.

KLAUZULA O JAMSTVU

Brižljivim je ispitivanjem dokazano da je proizvod pogodan za preporučene svrhe uz pridržavanje naše upute za upotrebu. Budući da se uskladištenje i primjena izvan našeg utjecaja i budući da mi ne možemo predvidjeti sve okolnosti koje na to utječu, isključujemo svaku jamstvu za eventualne štete kod uskladištenja i primjene. Mi jamčimo za nepromijenjenu kvalitetu proizvoda, dok rizik uskladištenja i primjene ne snosimo.

Sadržaj:

Aktivna tvar: Fipronil.....0,5 g/kg (0,05 % w/w)

CAS br.: 120068-37-3

Formulacija: gotovi mamac (RB)

Dozvola: MZSS, Klasa: UP/I-543-04/11-05/38,
Ubroj: 534-8-01-4/2-11-2. Zagreb, 15.travnja 2011.

Oznake opasnosti:

H412 Stetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Oznake obavijesti:

P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

P501 Odložiti sadržaj/spremnik predajom tvrtci ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.

Sprječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Sprječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.

Da bi se izbjegli rizici za ljudi i okoliš potrebno je pridržavati se uputa za upotrebu!

Broj šarže i datum proizvodnje: otisnut na pakiranju

Rok trajanja: 24 mjeseca

Zemlja podrijetla: Njemačka

Proizvođač:

BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Njemačka, Tel. 00-49-180-2273-112

Uvoznik i zastupnik za RH:

BASF Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb,
Tel.: 01 600 00 20

Procitaj priloženu uputu prije uporabe!