

# Storm® 4G BB

## Za profesionalnu uporabu Rodenticid, PT 14

Sadržaj: **5 kg**

Sadrži: flokumafen, 0,05 g/kg (0,005 % w/w), CAS br.: 421-960-0  
Broj odobrenja: KLASA: UP/I-543-04/15-12/06

Formulacija: mamac u obliku parafinskog bloka (za izravnу primјenu)

P102 Čuvati izvan dohvata djece. P280 Nosit zaštitne rukavice.

STORM® 4G BB je mamac u obliku parafinskog bloka (za izravnу primјenu) za suzbijanje kućnog miša (*Mus musculus*), smedeg štakora (*Rattus norvegicus*) i crnog štakora (*Rattus rattus*).

### Proizvođač:

BASF Agro B.V.  
Arnhem (NL)  
Zürich Branch  
Moosstrasse 2  
8036 Zürich  
Wiedikon, Švicarska

### Skladištenje:

Skladišti na hladnom, suhom i dobro provjetrenom mjestu. Zaštititi od vlage. Zaštititi od direktnog sunčevog svjetla. Skladišti podalje od hrane, pića i stične hrane, izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Ne smije se preispavljati u drugu ambalažu ni u posude iz kojih se jede i piće, ili u kojima se drže namirnice.

Temperatura skladištenja: 0 °C do + 30 °C

Broj serije i datum proizvodnje otisnuti su na drugom mjestu.

Rok upotrebe: najmanje 3 godine od proizvodnje, kod pravilnog uskladištenja u originalnoj zatvorenjo i neotešćenoj ambalaži, u polipropilenkoj (PP) ili papirnato/polietilenkoj (PE) ambalaži. Prodaja je dopuštena samo u originalnoj ambalaži.

### Znakovi otrovanja:

Nakon ustanjanja: proizvod se ne može udati zbog fizikalno-kemijskih svojstava. Nakon dodira s kožom: moguće crvenilo, peckanje i/ili surbež kod osjetljivih osoba. Nakon dodira s očima: moguće crvenilo, peckanje i/ili suženje pri direktnom kontaktu. Nakon gutanja: moguća mučnina i bol u probavnom traktu. Problemi s koagulacijom i povećana vjerljivost krvarenja. U težim slučajevima može doći do masivnih krvarenja u unutarnjim organima što može dovesti do cirkulatornog soka i smrtnog ishoda.

Prva pomoć: Ukloniti kontaminiranu odjeću. Ako se udahne: umriti pacijenta i izvesti na svježi zrak. Slatkiši kontakt s kožom: temeljito oprati sazapanim vodom. Nakon dodira s očima: ispirati očene oči i razmazati 15 minuta pod njenom vodom. Nakon gutanja: ispirati usta i nakon togati piti puno vode. Možni simptomi: posljedica poremećenog procesa zgruzavanja krvi.

Za daljnje informacije u slučaju sumnje na otrovanje nazvati broj 112 ili Centar za kontrolu otrovanja: 01-23-48-342

### Uputa za uporabu:

#### Područje primjene:

1. u oku zgrada
2. uporaba u kanalizaciji

#### Način primjene: u zaštitnim (deratizacijskim) kutijama za mamece

##### 1. a) Kućni miš (*Mus musculus*):

Po mjestu postavljanja treba upotrijebiti 16-32 g mameca (1 blok od 20 g; 1-2 bloka od 16 g; 4-8 blokova od 4 g). Razmak između mesta postavljanja mameca treba biti 1-2 metra.

Mjesa na kojima su mamci postavljeni treba pregledati 4-7 dana nakon postavljanja, a zatim redovito, ovisno o konzumaciji mameca, svakih 7 dana. Prilikom svake kontrole treba nadomjestiti iskoristeni mamac. Deratizacijski postupak ne bi trebao trajati dulje od 21 dana. Mamci se mogu postavljati tijekom cijele godine, i u oku zgrada.

##### 1. b) Smedji štakor (*Rattus norvegicus*) i crni štakor (*Rattus rattus*):

Po mjestu postavljanja treba upotrijebiti 32-60 g mameca (2-3 bloka od 20 g); 2-3 bloka od 16 g; 8-15 blokova od 4 g). Razmak između mesta postavljanja mameca treba biti 5-10 m.

Mjesa na kojima su mamci postavljeni treba pregledati nakon 4-7 dana, a zatim redovito, ovisno o konzumaciji mameca, svakih 7 dana. Prilikom svake kontrole treba nadomjestiti iskoristeni mamac. Deratizacijski postupak ne bi trebao trajati dulje od 35 dana. Mamci se mogu postavljati tijekom cijele godine, u kanalizaciju.

##### 2. Smedji štakor (*Rattus norvegicus*):

Po mjestu postavljanja (po kanalizacijskom otvoru) treba upotrijebiti 100-200 g mameca (5-10 blokova od 20 g).

Mjesa na kojima su mamci postavljeni treba pregledati 4-7 dana nakon postavljanja, a zatim redovito, ovisno o konzumaciji mameca, svakih 7 dana. Prilikom svake kontrole treba nadomjestiti iskoristeni mamac. Deratizacijski postupak ne bi trebao trajati dulje od 35 dana. Mamci se mogu postavljati tijekom cijele godine, u kanalizaciju.

##### Spriječavanje pojave rezistentnosti (otpornosti):

Pozivamo na korak u napred u borbi protiv pojave rezistencije na sličnu tvor ovog proizvoda - flokumafen. Stoga, ovaj proizvod ne bi trebao upotrebljavati u situacijama kada se pretpostavlja da otpornost na flokumafen postoji, na primjer u slučajevima kada posljednja primjena flokumafena nije rezultirala smanjenjem populacije glodavaca. Proizvod ne bi trebalo koristiti trajno (neprekidno).

U većini slučajeva, deratizacijski postupak s ovim proizvodom bi trebao postići kontrolu nad infestacijom mješavina unutar 21 dan, štakorima za 28 dana i smedim štakorima u kanalizaciji za 35 dana. Ukoliko se aktivnost kućnih miševa, smedih ili crnih štakora nastavi nakon tog vremena, trebalo bi utvrditi vjerljativi uzrok toga i poduzeti potrebne mjeru.

### Zaštita voda:

Pri postavljanju STORM® 4G BB treba sprječiti onečišćenje vodotokova, zdenaca, jezera, mora i izvora voda. Ostaci sredstva ne smiju se bacati u kanalizaciju ni na otvorene površine.

### Mjere sigurnosti i zaštitna oprema:

Zaštitna očiju i lica: zaštitne naočale s bočnim štitnicima (HRN EN 166).

Zaštitna ruka: zaštitne rukavice (HRN EN 374). (Preporuka: zaštitni indeks: 6; vrijeme prodora: > 480 min.; materijal: nitrilna guma (0,4 mm), kloroprenska guma (0,5 mm), butilna guma (0,7 mm)).

Zaštitni tijela i nogu: zaštitna tijela i nogu bira se ovisno o aktivnostima i mogućnostima izlaganja proizvodu, npr. zaštitna odjeća dugih rukava i nogavica (HRN EN 340), obuća koja obuhvaća cijelo stopalo (HRN EN 13832). Prema potrebi koristiti pregaču i/ili druga sredstva zaštite.

Zaštitna oprema za zdravstvene radnike: nje potrebna.

### Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Na kraju provedene deratizacije treba neiskorištenje mamece ukloniti u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

Otvorene glodavce treba ukloniti na način propisan Zakonom o veterinarstvu odnosno predati pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za skupljanje takve vrste otpada.

Nakon uporabe ambalažu ne upotrebljavati ponovno ni u koje svrhe i ne baciti u okoliš, nego predati na zbrinjavanje tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.

### Mjere za smanjenje rizika:

Obvezno treba sprječiti pristup životinjama kojima proizvod nije namijenjen.

Macici trebaju biti postavljeni na siguran način, kako bi se smanjio rizik da će ih konzumirati druge životinje ili dječaci.

Ako je moguće, mamece treba privrstiti kako ih se ne bi moglo odvuci.

Proizvod ne smije se načiniti neispravno.

Ugulinje glodavce treba potražiti i ukloniti u pravilnim vremenskim razmacima tijekom deratizacije, a najmanje pri provjeri, odnosno nadupoznavajući mameca. U nekim okolnostima nužan je svakodnevni pregled. Kod obdarivanih rodenticida treba uzeti u obzir otpornost ciljne populacije. U područjima u kojima postoji sumnja na otpornost glodavaca na određene aktivne tvari, treba izbjegavati njihov uporabu. Kako bi se spriječio razvoj otpornosti, preporučuje se naizmjenično primjenjivati mamece koji sadrže različite antikoagulantne aktivne tvari.

Antikoagulanti rodenticidi ne treba upotrebljavati kao trajne mamece, osim ako deratizaciju nadzire profesionalni izvođitelj mješanja suzbijanja štetnika ili druga stručna osoba.

U većini slučajeva, antikoagulanti mamece trebaju biti ostvariti cilj suzbijanja u roku od 35 dana.

Proizvod sadrži BitrexTM radi sprečavanja slučajnog uzimanja mamece od strane ljudi.

### Mjere zaštite u slučaju nezgodne u zatvorenom prostoru i pri prijevozu:

1. U slučaju nezgodne u zatvorenom prostoru poduzimaju se ove mjere zaštite:

a) Osoba koja će ući ili se naleti na kontaminiranoj prostoriji treba obući zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti protuprašinski filterku polukrušu ili poluštamku s protuprašinskim filterom označenim slovom P.

b) Prospiranje proizvoda temeljito se prikupi u kontejner koji je predviđen za tu namjenu. Nakon toga se kontaminirana površina opere vodom i detergentom, odnosno vapenjem mlijekom ili 5 %-tom vodenom otopinom natrijevog hidroksida i tekućina se također pokupi u kontejner s otpadnim proizvodom.

c) Ukoliko se pojavi **pozar** gasi se prahom ili CO2 uz obveznu upotrebu sredstva za zaštitu dišnih puteva (samostalni dišni uređaj s otvorenim ili zatvorenim krugom).

d) Nakon čišćenja, osoba koja je radila na čišćenju treba se osušiti.

2. Mjere zaštite u slučaju nezgode pri prijevozu:

a) Ugasiti motor vozila, otvoriti vatru i ne pušiti.

b) Osigurati mjesto dogadjaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.

c) U obveznu upotrebu zaštinskih sredstava oštećenog ambalažu odstraniti od neotešćene.

d) U slučaju pojava požara odmah početi s gasenjem požara i pozvati u pomoć vatrogasnu brigadu ili DVD.

e) Izvještiti policiju.

f) U slučaju otrovanja pružiti prvu pomoć i pozvati liječnika.

g) Za potrebne informacije obratiti se na adresu nositelja odobrenja/zastupnika.

U slučaju onečišćenja rijeke, jezera ili odvoda obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj 112.

### KLAUZULA O JAMSTVU

Brižljivim je ispitivanjima dokazano da je proizvod pogodan za preporučene svrhe, uz pridržavanje upute za upotrebu. Budući da su uskladištenja i primjena izvan našeg utjecaja i da mi ne možemo predviđati sve okolnosti koje na to utječu, isključujemo svako jamstvo za eventualne štete pri uskladištenju i primjeni. Jamčimo da nepromjenjenu kvalitetu proizvoda, ali rizik uskladištenja i primjene ne snosimo.

\* - registrirano ime tvrtke BASF



4 0 1 4 3 4 8 1 9 7 2 2 3 9



Datum proizvodnje:

Broj šarže:

81098466HR1075-Croatia