

Cantus®

Fungicid

Moćive samodispersirajuće mikrogranule – WG
koncentrat za suspenziju

Cantus® je fungicid za suzbijanje uzročnika sive pljesni (*Botrytis cinerea*) na vinovoj lozi u koncentraciji od 0,1 – 0,12% (100 – 120 g u 100 l vode) uz najviše dva tretiranja u vegetaciji. Prilikom primjene smanjuje napad pepelnice vinove loze (*Uncinula necator*).

1 kg

GRUPA	7	FUNGICID
-------	---	----------

Sadržaj: 1 kg

Sadrži: boskaliđ, 500 g/kg (50% w/w), CAS br.: 188425-85-6, Registracijski broj sredstva: UP/I-320-20/04-01/209.

P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. P102 Čuvati izvan dohvata djece. Da bi se izbjegli rizici za zdravstvo ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu. SP 1 Sprječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. SPe 3: Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti od 20 metara do vodene površine. Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena. Prije upotrebe pročitajte popratne upute.

Samo za profesionalne korisnike. Nikad ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.

Simptomi trovanja: Sredstvo ima nisku akutnu, dermalnu i inhalacijsku toksičnost. Do sada nisu zapaženi slučajevi trovanja kod ljudi u proizvodnji i pripremi uz pridržavanje uobičajenih mjeru osobne zaštite pri radu, niti su se manifestirali štetni učinci za zdravlje.

Mjere prve pomoći: Osigurajte ambalažu, etiketu ili Sigurnosno-tehnički list prije poziva službi za izvanredna stanja, Centru za kontrolu otrovanja, liječniku, ili prije odlaska na liječenje. **Nakon udisanja:** unesrećenu osobu iznijeti iz kontaminiranog područja u dobro prozraćeno prostoriju ili na svježi zrak i odmah pozvati liječnika. U slučaju prestanka disanja primjeniti umjetno disanje.

Nakon dodira s kožom: svući svu kontaminiranu obuću i odjeću. Mjesta dodira temeljito ispirati tekućom, mlakom vodom i sapunom kroz najmanje 15 minuta. Ako se i nakon tog vremena pojave i zadrže simptomi iritacije nastaviti ispiranje i zatržiti pomoć liječnika. Radnu odjeću potrebno je oprati prije ponovne upotrebe. **Nakon dodira s očima:** čistim prstima držati kapke otvorenima te ispirati oči laganim mlazom čiste vode kroz najmanje 15-20 minuta. Ako se i nakon tog vremena pojave i zadrže simptomi iritacije zatržiti pomoć oftalmologa. **Nakon gutanja:** NE izazivati povraćanje, isprati usta s puno vode te dati popiti 2,5-3 dl vode. Unesrećenog hitno prevesti u najbližu zdravstvenu ustanovu. Nikada ne izazivati povraćanje ili davati tekućinu na usta ako je ozlijedena osoba u nesvesti ili ima grčeve.

® = registrirano i zaštićeno ime tvrtke BASF

Rok uporabe: 5 godina, uz pravilno uskladištenje u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

Uskladištenje: Sredstvo treba uskladistiti u originalno zatvorenoj ambalaži na prohladnom i suhom mjestu, u posebnoj prostoriji pod klučem, odvojeno od ljudske i stocne hrane te drugih proizvoda, izvan dohvata nestručnih osoba i životinja. Ne smije doći u ruke djece. Skladišti pri temperaturi ne nižoj od -5 °C ni višoj od 30 °C. Prodaja dozvoljena samo u originalnoj ambalaži. **Broj šarže i datum proizvodnje:** iz tehničkih su razloga obrisani na drugom mjestu.

Vlasnik rješenja

o registraciji:

BASF SE

67056, Ludwigshafen

Njemačka

Zastupnik RH:

BASF Croatia d.o.o.

Slavonska avenija 1b

10000 Zagreb

www.agro.bASF.hr

Tel. 01/600 0020

Pakira, označava i distribuira:

i Chromos Agro d.o.o.

Radnička c. 173n, 10002

Zagreb, tel. 01/6040 356.

Uvoznik za BiH:

SJEMENARNA d.o.o.

fra Didača Buntića 160 A

88220 Široki Brijeg

Tel: +387 39 700 000



8 606017 420682



otvorite



UPUTA ZA UPORABU

Djelovanje

CANTUS® je preventivni sistemični fungicid s translaminarnim djelovanjem.

Primjena

CANTUS® je fungicid za suzbijanje uzročnika sive pljesni (*Botrytis cinerea*) na vinovoj lozi u koncentraciji od 0,1 – 0,12% (100 – 120 g u 100 l vode) uz najviše dva tretiranja u vegetaciji. Prilikom primjene smanjuje napad pepelnice vinove loze (*Uncinula necator*).

CANTUS® se primjenjuje prskanjem klasičnim (leđnim ili traktorskim) prskalicama i raspršivanjem raspršivačima (tzv. atomizerima).

NAPOMENA: Gore navedene koncentracije pretpostavljaju da se troši 1000 l škropiva po hektaru vinograda. Ako se za primjenu koriste prskalice koje proizvode vrlo fine kapljice pa troše manje škropiva po hektaru (manje od 1000 l/ha) ili raspršivači koji troše još manje škropiva, tada treba povećati koncentraciju sredstva za toliko za koliko se količina škropiva snizila ispod 1000 l škropiva po hektaru.

Ograničenja

Sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta u vegetaciji.

U programu zaštite koristiti fungicide iz drugih skupina djelovanja.

Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.

Priprema sredstva za uporabu

Odvojiti dio vode za naknadno ispiranje.

Priprema: Odmjerena količina sredstva pomiješa se s malo vode u posebnoj posudi dok se ne dobije fina jednolična suspenzija koja se uz stalno miješanje ulije u spremnik prskalice ili raspršivača koji je napunjen 3/4 vodom te se doda potrebna količina vode određene za prskanje.

Napomena: Trostrukim ispiranjem preostalog sadržaja s vodom maksimalno čete iskoristiti sadržaj upotrebljenog sredstva. Navedenim postupkom u najvećoj mogućoj mjeri smanjujete mogućnost zagađenja okoliša otpadnom ambalažom prilikom njezina odlaganja i zbrinjavanja.

1.

Miješanje

CANTUS® se ne mijesha s preparatima na bazi fosetyl-Al, dimetoata, dodina, endosulfana, amitraza, cipermetrina.

Fitotoksičnost

Ako se sredstvo upotrebljava u navedenim koncentracijama, na pravilan način i u optimalno vrijeme, ono nije fitotoksično za vinovu lozu. To se odnosi na poznate sorte, a nove sorte treba ispitati na fitotoksičnost.

Karenca

28 dana za vinovu lozu.

Radna zabrana

24 sata i za rezidue 3 dana.

Zaštita voda

Sredstvo se ne smije koristiti u zonama sanitarno zaštite vode za piće. Prilikom primjene mora se spriječiti onečišćenje voda, izvora voda i bunara ostavljanjem neprskane zaštitne površine najmanje 20 m. Ostaci škropiva ne smiju se izljevati u kanale i otvorene vodotokove.

Utjecaj na korisne organizme

Ne oštećuje populacije predavata: *Paradosa amentata*, *Typhlodromus pyri*, *Pterostichus supreus*, *Chrysoperla carnea*, *Aphidius rhopalosiph*. Iako nije mikrobicid, slabo se razgrađuje metodom aktivnog mulja. Ne oštećuje mikrobiološku aktivnost tla.

Otrovnost i mjere zaštite

Sredstvo je otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Kod rada ne jesti, piti niti pušiti. Ne prskati protiv vjetra, spriječiti ulazak sredstva u organizam nošenjem zaštitne opreme. Za zaštitu dišnih puteva koristiti protuprašinsku filtersku polumasku ili polumasku s protuprašinskim filterom označenim slovom P.

Ruke štititi gumenim rukavicama, a tijelo laganim zaštitnim odijelom dugih rukava.

Ukoliko prijeti opasnost od prskanja kemikalije, za zaštitu upotrijebiti gumenu pregaču.

Za zaštitu očiju koristiti naočale ili vizir koji dobro prijanjaju, a posebice prilikom uporabe sredstva. Nakon rada treba presvući radno odijelo, a ruke i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom.

2.

Simptomi trovanja

Sredstvo ima nisku akutnu, dermalnu i inhalacijsku toksičnost. Do sada nisu zapaženi slučajevi trovanja kod ljudi u proizvodnji i pripremi uz pridržavanje uobičajenih mjera osobne zaštite pri radu, niti su se manifestirali štetni učinci za zdravljie.

Mjere prve pomoći

Osigurajte ambalažu, etiketu ili Sigurnosno-tehnički list prije poziva službi za izvanredna stanja, Centru za kontrolu otrovanja, liječniku, ili prije odlaska na liječenje.

Nakon udisanja: unesrećenu osobu iznijeti iz kontaminiranog područja u dobro prozračenu prostoriju ili na svježi zrak i odmah pozvati liječnika. U slučaju prestanka disanja primjeniti umjetno disanje.

Nakon dodira s kožom: svuči svu kontaminiranu obuću i odjeću. Mjesta dodira temeljito ispirati tekućom, mlakom vodom i sapunom kroz najmanje 15 minuta. Ako se i nakon tog vremena pojave i zadrže simptomi iritacije nastaviti ispiranje i zatražiti pomoć liječnika. Radnu odjeću potrebno je oprati prije ponovne upotrebe.

Nakon dodira s očima: čistim prstima držati kapke otvorenima te ispirati oči laganim mlazom čiste vode kroz najmanje 15-20 minuta. Ako se i nakon tog vremena pojave i zadrže simptomi iritacije zatražiti pomoć oftalmologa.

Nakon gutanja: NE izazivati povraćanje, isprati usta s puno vode te dati popiti 2,5 - 3 dl vode. Unesrećenog hitno prevesti u najbližu zdravstvenu ustanovu. Nikada ne izazivati povraćanje ili davati tekućinu na usta ako je ozlijedena osoba u nesvijesti ili ima grčeve.

Mjere zaštite u slučaju nezgode:

1. U slučaju nezgode u **zatvorenom prostoru** poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

1.1. Prije ulaska u kontaminirani prostor obuci zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti filtersku polumasku ili masku za zaštitu od čestica.

1.2. **Rasuto sredstvo** temeljito pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu.

Nakon toga kontaminirane površine oprati smjesom vode i deterdženta ili 5%-tom vodenom otopinom natrijevog hidroksida, koje se također, nakon upotrebe treba

3.

