

Signum®

Fungicid

Močive samodispergirajuće mikrogranule – WG

Koncentrat za suspenziju

Signum® je kombinirani preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u poljoprivredi, voćarstvu, povrćarstvu i ratarstvu.

GRUPA

7

11

FUNGICID

1 kg

Sadržaj: 1 kg

Sadrži: boskalid, 267 g/kg (26,7 % w/w), CAS br.: 188425-85-6
i piraklostrobin, 67 g/kg (6,7 % w/w), CAS br.: 175013-18-0 Rješenje: UP/I-320-20/06-01/247

H410 Vrlo otrovno za vodení okoliš, s dugotrajnim učincima.

P101 Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P391 Sakupiti rasuto. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa Zakonom o otpadu i njegovom podzakonskim aktima. **Da bi se izbjegli rizici za zdravље ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.** SP 1 Sprječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. SPo Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica kod pripreme škropiva i rukovanja nerazrijetenim sredstvom i u dodiru s površinama onečišćenim nerazrijetenim sredstvom ili škropivom. SPo Obavezno je nošenje zaštitne odjeće i rukavica kod primjene pomoći ledne i ručne prskalice i rukovanja razrijetenim sredstvom ili škropivom.

Prilikom primjene mora se sprječiti onečišćenje voda, izvora voda i bunara ostavljanjem neprskane zaštitne površine najmanje 20 m.

Prije uporabe pročitajte popratne upute. Samo za profesionalne korisnike. Nikad ne koristiti praznu ambalažu za druge svrhe. Prva pomoć: Unesrećenog maknuti iz kontaminiranog područja i osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati sa liječnikom. Detalje vidjeti u uputu.

® = registrirano i zaštićeno ime tvrtke BASF

Rok uporabe: 5 godina, uz pravilno uskladištenje u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

Uskladištenje: sredstvo treba uskladištiti u originalno zatvorenoj ambalaži na prohладnom i suhom mjestu, u posebnoj prostoriji pod klijucem, odvojeno od ljudske i stocne hrane te drugih proizvoda, izvan dohvata nestručnih osoba i životinja. Ne smije doći u ruke djece. Skladištiti pri temperaturi ne nižoj od -5 °C ni višoj od 30 °C. Spremniči čuvati od direktnog sunčevog utjecaja.

Prodaja dozvoljena samo u originalnom pakiranju. Broj šarže i datum proizvodnje otisnuti su na ambalaži.

8 606017 420033



Vlasnik rješenja
o registraciji:
BASF SE, 67056
Ludwigshafen
Njemačka

Zastupnik za RH:
BASF Croatia d.o.o.
Slavonska avenija 1b
10000 Zagreb
Tel. 01/600 0020

Pakira, označava i distribuira:
Chromos Agro d.o.o.
Radnička c. 173n, 10002
Zagreb, tel. 01/6040 356.

Uvoznik za BiH:
SJEMENARNA d.o.o.
fra Didaka Buntića 160 A
88220 Široki Brijeg
Tel: +387 39 700 000

otvorite

UPUTA ZA UPORABU

Djelovanje: Signum® je kombinirani preventivni fungicid.

Primjena: Signum® je fungicid za suzbijanje sljedećih biljnih bolesti:

- 1) u **koštičavom voću** za suzbijanje uzročnika sušenja cvjetova i grančica (*Monilia laxa*) i truleži plodova (*Monilia fructigena*) u koncentraciji od 0,056%–0,075%. Dopuštene su maksimalno tri primjene u vegetaciji;
- 2) u **jagodama** za suzbijanje sive pljesni (*Botrytis cinerea*) u količini od 1,5 kg/ha u 1000 l vode/ha. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji;
- 3) u **paprici** za suzbijanje pepelnice (*Leveillula taurica*) u koncentraciji 0,1%–0,15%. Dopuštene su maksimalno tri primjene u vegetaciji;
- 4) u **rajčici** za suzbijanje pepelnice (*Leveillula taurica*) i sive pljesni (*Botrytis cinerea*) u koncentraciji 0,1%–0,15%. Dopuštene su maksimalno tri primjene u vegetaciji. Utrošak vode: 200-1000 l/ha;
- 5) u **krumpiru** za suzbijanje koncentrične pjegavosti lista (*Alternaria solani*) u količini od 0,25 kg/ha u 300 l vode/ha;
- 6) u **salatama glavaticama**, za suzbijanje bijele truleži (*Sclerotinia sclerotiorum*) i sive pljesni (*Botrytis cinerea*) u količini od 1,0 kg/ha. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji;
- 7) u **kupusu** za suzbijanje prstenaste pjegavosti (*Mycosphaerella brassicicola*) i pjegavosti kupusnjača (*Alternaria spp.*) u količini od 1,0 kg/ha u 500 l vode/ha. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji;
- 8) u **luku** za suzbijanje sive pljesni (*Botrytis spp.*) u količini od 1,5 kg/ha u 500 l vode/ha (150 g u 50 l vode na 1000 m²);
- 9) u **mrkvu** za suzbijanje paleži lišća mrkve (*Alternaria dauci*) i pepelnice (*Erysiphe heraclei*) u količini od 0,75–1,0 kg/ha u 400 l vode/ha. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji.

Fitotoksičnost

Ako se sredstvo upotrebljava u navedenim koncentracijama i količinama, na pravilan način i u optimalno vrijeme, ono nije fitotoksično za navedene kulture. To se odnosi na poznate sorte, a nove sorte treba ispitati na fitotoksičnost.

Karenca

3 dana za rajčicu i jagode; 7 dana za slatkore sorte paprike i koštičavo voće; 14 dana za mrkvu, salatu i krumpir; 21 dan za luk, kupus i ljute sorte paprike.

Male kulture i/ili male namjene:

Signum® je fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na **malim kulturama i/ili malim namjenama**.

Učinkovitost i fitotoksičnost sredstva Signum® nisu ispitane na brokulji, cvjetači, grahu, kelju pupčaru, šparogu, crnom, bijelom i crvenom ribizu, bademu, ljesku, orahu, maslačku, lukolisnoj kozjoj bradi, endiviji, cikoriji, poriluku, blitvu, češnjaku, luku kozjaku (ljutiku), celeru, patlidžanu, začinskom bilju, ukrasnom bilju, cvijeću, ukrasnom drveću i grmlju, borovnici i malini.

Zato svu odgovornost za primjenu sredstva Signum® na malim kulturama i/ili malim namjenama preuzima korisnik sredstva.

Primjena:

Kombinirani preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na:

- 1) u **brokulji** za suzbijanje koncentrične pjegavosti (*Alternaria spp.*) i prstenaste pjegavosti (*Mycosphaerella brassicicola*) u količini 1,0 kg/ha u 200-400 l vode/ha. Dopuštene su maksimalno tri primjene u vegetaciji;
- 2) u **cvjetači** za suzbijanje koncentrične pjegavosti (*Alternaria spp.*) i prstenaste pjegavosti (*Mycosphaerella brassicicola*) u količini 1,0 kg/ha u 200-400 l vode/ha. Dopuštene su maksimalno tri primjene u vegetaciji;
- 3) u **grahu** za suzbijanje hrde graha (*Uromyces appendiculatus*) i sive pljesni (*Botrytis spp.*) u količini 1,0 kg/ha u 200-300 l vode/ha. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji;

[1]

4) u **kelju pupčaru** za suzbijanje bijele hrde (*Albugo candida*) i prstenaste pjegavosti (*Mycosphaerella brassicicola*) u količini 1,0 kg/ha u 200-400 l vode/ha. Dopuštene su maksimalno tri primjene u vegetaciji;

5) u **šparogi** za suzbijanje hrde (*Puccinia asparagi*), sive pljesni (*Botrytis cinerea*) i purpurne pjegavosti (*Stemphylium vesicarium*) u količini 1,5 kg/ha u 400-600 l vode/ha. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji;

6) u **crnom ribizu** za suzbijanje sive pljesni (*Botrytis cinerea*) i pepelnice (*Podosphaera mors-uvae*) u količini 1,5 kg/ha u 200-1000 l vode/ha. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji;

7) u **crnom ribizu** za suzbijanje pepelnice (*Podosphaera mors-uvae*) i pjegavosti (*Drepanopeziza ribis*) u količini 1,5 kg/ha u 200-1000 l vode/ha. Dopuštene je maksimalno jedna primjena u vegetaciji.

8) u **bademu** za suzbijanje:

a) paleži cvijeta i mladica (*Monilinia spp.*) u količini 1,0 kg/ha, primjeniti u fenofazi pune cvatnje do fenofaze ispadanja latica,

b) kovčavost lišća (*Taphrina deformans*) u količini 1,0 kg/ha, primjeniti između ožujka i svibnja, da se zaštite mlađi listovi,

c) šupljikavosti lišća (*Stigmella carpophila*) u količini 1,0 kg/ha, primjeniti u fenofazi neposredno prije cvatnje do 10-15 dana nakon cvatnje. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji,

9) u **ljesku** za suzbijanje sive pjegavosti lista (*Gnomonia leptostyla*) u količini 1,0 kg/ha. Tretiranje započeti početkom razvoja listova. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji,

10) u **orahu** za suzbijanje sive pjegavosti lista (*Gnomonia leptostyla*) u količini 1,0 kg/ha. Tretiranje započeti početkom razvoja listova. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji,

11) u **maslačku** za suzbijanje rizoktonije (*Rhizoctonia spp.*) u količini 1,5 kg/ha. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji,

12) u **lukolisnoj kozjoj bradi** (bijeli korijen, vrtni turovac) za suzbijanje pepelnice (*Oidium spp.*) i koncentrične pjegavosti (*Alternaria spp.*) u količini 0,4 kg/ha. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji,

13) u **endiviji** na otvorenom i u zaštićenom prostoru, za suzbijanje bijele truleži (*Sclerotinia spp.*), sive pljesni (*Botrytis spp.*) i rizoktonije (*Rhizoctonia spp.*) u količini 1,5 kg/ha, s razmakom između tretiranja od 7-10 dana, može se primjeniti odmah nakon sadnje. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji,

14) u **cikoriji** na otvorenom i u zaštićenom prostoru, za suzbijanje bijele truleži (*Sclerotinia spp.*), sive pljesni (*Botrytis spp.*) i rizoktonije (*Rhizoctonia spp.*) u količini 1,5 kg/ha. Dopuštена je jedna primjena u vegetaciji,

15) u **poriluku** za suzbijanje:

a) pjegavosti lišća (*Alternaria porii*) u količini 0,6 kg/ha,

b) plamenjače (*Peronospora destructor*) u količini 1,0 kg/ha. Sredstvo primjeniti preventivno kada se pojave povoljni uvjeti za razvoj bolesti. Dopuštene su maksimalno tri primjene u vegetaciji,

16) u **blitvi** na otvorenom i u zaštićenom prostoru, za suzbijanje sive pljesni (*Botrytis spp.*) u količini 1,5 kg/ha, s razmakom između tretiranja od 7-10 dana. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji,

17) u **češnjaku, luku kozjaku (ljutiku)** na otvorenom prostoru, za suzbijanje sive pljesni (*Botrytis spp.*), hrda (*Puccinia allii*) i bijele truleži (*Sclerotium cepivorum*) u količini 1,5 kg/ha, u vremenskom razmaku između tretiranja od 7 dana. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji,

18) u **patlidžanu** na otvorenom i u zaštićenom prostoru, za suzbijanje pepelnice (*Leveillula taurica*) i sive pljesni (*Botrytis spp.*) u količini 1,5 kg/ha s razmakom između tretiranja od 7-10 dana. Dopuštene su maksimalno tri primjene u vegetaciji,

19) u **začinskom bilju** na otvorenom i u zaštićenom prostoru, za suzbijanje sive pljesni (*Botrytis spp.*) i bijele truleži (*Sclerotinia spp.*) u količini 1,5 kg/ha, s razmakom između tretiranja od 7-10 dana. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji,

20) u **ukrasnom bilju i cvijeću** u zaštićenom prostoru, za suzbijanje sive pljesni (*Botrytis spp.*) i pepelnice (*Oidium spp.*) u količini 1,0-1,5 kg/ha s razmakom između tretiranja od 7-10 dana. Dopuštene su maksimalno tri primjene u vegetaciji,

21) u **ukrasnom drveću i grmlju** za suzbijanje:

a) pjegavosti (*Septoria spp.*) u količini 1,0 kg/ha. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji,

b) pepelnice (*Oidium spp.*) u količini 0,6 kg/ha. Dopuštene su maksimalno tri primjene u vegetaciji,

22) u **celeru** za suzbijanje sive pjegavosti lista (*Septoria apicola*) i bijele truleži (*Sclerotinia sclerotiorum*), primjeniti u količini od 1 kg/ha, u fazi razvoja u maksimalno dvije primjene u vegetacijskoj sezoni s minimalnim vremenskim razmakom između primjena od 10 dana.

[2]

23) **borovnici (na otvorenom)** za suzbijanje pjegavosti (*Drepanopeziza ribis*) i sive pljesni (*Botrytis cinerea*) u količini 1,5 kg/ha. Dopuštene su najviše dvije primjene u vegetaciji s najmanjim razmakom između primjena od 7 dana.

Karenca: 3 dana za borovnicu (na otvorenom);

24) **borovnici (u zaštićenom prostoru)** za suzbijanje pjegavosti (*Drepanopeziza ribis*) i sive pljesni (*Botrytis cinerea*) u količini 1,0 kg/ha. Dopuštene su najviše tri primjene u vegetaciji s najmanjim razmakom između primjena od 7 dana.

Karenca: 14 dana za borovnicu (u zaštićenom prostoru);

25) **malini (na otvorenom)** za suzbijanje pjegavosti (*Drepanopeziza ribis*) i sive pljesni (*Botrytis cinerea*) u količini 1,5 kg/ha. Dopuštene su najviše dvije primjene u vegetaciji s najmanjim razmakom između primjena od 7 dana.

Karenca: 3 dana za malinu (na otvorenom);

26) **malini (u zaštićenom prostoru)** za suzbijanje pjegavosti (*Drepanopeziza ribis*) i sive pljesni (*Botrytis cinerea*) u količini 1,0 kg/ha. Dopuštene su najviše tri primjene u vegetaciji s najmanjim razmakom između primjena od 7 dana.

Karenca: 7 dana za malinu (u zaštićenom prostoru);

27) **ribizu (bijeli i crveni) (na otvorenom)** za suzbijanje pjegavosti (*Drepanopeziza ribis*) i sive pljesni (*Botrytis cinerea*) u količini 1,5 kg/ha. Dopuštene su najviše dvije primjene u vegetaciji s najmanjim razmakom između primjena od 7 dana.

Karenca: 3 dana za ribiz (bijeli i crveni) (na otvorenom).

Vrijeme primjene

- Sredstvo Signum® se na **brokulji, cvjetači, grahu i kelju pupčaru** primjenjuje na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti.

- Sredstvo se na **šparogama** smije primjeniti:

a) u godini berbe nakon završetka berbe,

b) na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti.

- Sredstvo se smije primjeniti na **crnom ribizu** za suzbijanje sive pljesni (*Botrytis cinerea*) i pepelnice (*Podosphaera mors-uvae*):

a) **od početka cvatnje ribiza do berbe**,

b) na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti.

- Sredstvo se smije koristiti na **crnom ribizu** za suzbijanje pepelnice (*Podosphaera mors-uvae*) i pjegavosti (*Drepanopeziza ribis*):

a) sredstvo se primjenjuje **nakon berbe do opadanja listova**,

b) na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti.

Vremenski razmak između primjena

Kod brokule, cvjetače, graha i kelja pupčara vremenski razmak između primjena je 3-4 tjedna; kod šparoga 14 dana; kod crnog ribiza 10-14 dana.

Karenca

14 dana za brokulju, cvjetaču, kelj pupčar, maslačak, lukolisnu kozju bradu (bijeli korijen, vrtni turovac, endiviju, celer, češnjak, luk kozjak i začinsko bilje; 21 dan za grah, poriluk i cikoriju na otvorenom prostoru i 3 dana za crni ribiz i patlidžan; 28 dana za badem, ljesku, orah i cikoriju u zaštićenom prostoru.

Za šparogu je osigurana vremenom primjene.

Nije primjenjiva za ukrasno bilje i cvijeće te za ukrasno drveće i grmlje.

Radna zabrana

Na tretiranu površinu na otvorenom ne smije se ulaziti 4 sata, a u zaštićeni prostor 8 sati.

[3]

