BASF FUNGICIDI ZA ZAŠTITU JABUKE - NEZAOBILAZNI DIO SVAKOG PROGRAMA

Promjene uvjeta proizvodnje kojima su biljke izložene – traže reakciju proizvođača. Zahtjevi tržišta koje uglavnom određuju konzumenti i trgovci jabukom, prenose se na proizvođača ali i na potrebu promjene dosadašnjih proizvodnih praksi. Podizanjem intenzivnosti ostvaruju veći prinos i količinu plodova prve klase u kontinuitetu. Sve osim prve klase posljednjih godina uglavnom ima nisku tržišnu vrijednost.

U ovako uspostavljenom sistemu i najmanja greška može dovesti do velikih šteta.

Zabranom primjene pojedinih aktivnih tvari, BASF postaje **nezaobilazni partner u kreiranju programa zaštite plodovitog voća.** Počevši s trenutno jedinim fungicidom iz skupine ditiokarbamata **Polyram® DF** (metiram) pa sve do fungicida koji su sinonim za uspješnu proizvodnju jezgričastog voća: **Delan® WDG i Delan® Pro.**

Pozitivan utjecaj na imunitet biljke biljke, vrhunski učinak kod ostvarenih infekcija bez prisutne rezistencije, prednosti su BASF fungicida: **Faban®, Sercadis® i Bellis®.**

Od ove godine zaštita voća će biti olakšana još jednim fungicidom iz naše palete, koji svojim imenom i učinkovitošću govori da je u pitanju revolucionarno rješenje – **Revyona®**.

BASF se aktivno prilagođava novonastalim uvjetima proizvodnje, razvojem novih proizvoda i kreiranjem novih trendova kojim će zadovoljiti i najstrože zahtjeve tržišta.

Revyona®

Bolja i drugačija

PROFIL PROIZVODA

AKTIVNA TVAR:
Mefentriflukonazol 75 g/l (Revysol®)

FORMULACIJA:
Koncentrirana suspenzija (SC+)

PRIMJENA:
čađava krastavost lista i ploda (*Venturia inaequalis, Venturia pyrina*), pepelnica (*Podosphaera leucotricha*), smeđa trulež ploda (*Stemphylium sp.*) i pjegavost lista (*Alternaria mali*)

DOZA:
2l/ha za jabuku i krušku

NAČIN DJELOVANJA:
Sistemično

PREPORUČENO VRIJEME UPORABE:
Preporučena primjena tijekom sezone u periodu neposredno pred cvatnju BBCH59 do perioda ranog formiranja plodova BBCH 71 u tank mix kombinaciji s kontaktnim fungicidom.

BROJ PRSKANJA:
3 puta

KARENCA:
21 dan

Revyona® je inovativni fungicid baziran na jedinstvenoj aktivnoj tvari Revysol®, koja pruža zaštitu od širokog spektra bolesti, neovisno o vremenskim uvjetima.
Revyona® je jednostavna i fleksibilna za primjenu, što vam olakšava planiranje zaštite vaših zasada.
Pokazuje učinkovitost i u uvjetima gdje imamo prisutnu rezistenciju.
Djeluje preventivno i kurativno na svim temperaturama, izuzetno je selektivna, otporna na ispiranje kišom i lako se miješa sa drugim sredstvima za zaštitu bilja.

Drugačije i bolje suzbijanje bolesti jabuke
- **JEDNO** rješenje za **tri najvažnije bolesti jabuke: čađava krastavost lista i ploda, pepelnica i alternarijska pjegavost**
- Učinkovita i na otporne sojeve čađave krastavosti
- Djeluje preventivno i kurativno

Sercadis®

Nezamijenjiv dio slagalice
Novi standard protiv pepelnice

PROFIL PROIZVODA

AKTIVNA TVAR:
300 g/l Xemium®

FORMULACIJA:
koncentrirana suspenzija (SC)

PRIMJENA:
pepelnica jabuke (*Podosphaera leucotricha*), čađava krastavost jabuke (*Venturia inaequalis*), i čađava krastavost kruške (*Venturia pyrina*).

DOZA:
0,25 l/ha jabuka i kruška.

NAČIN DJELOVANJA:
sistemično

PREPORUČENO VRIJEME UPORABE:
jabuka: od faze zelenog pupa (BBCH 53) do početka zriobe (BBCH 81)

BROJ PRSKANJA:
3 prskanja godišnje

KARENCA:
35 dana za jabuku i krušku

- Sercadis® je fungicid širokog spektra za sigurnu zaštitu od pepelnice i čađave krastavosti u jezgričavom voću.
- Aktivna tvar Xemium® posjeduje izuzetnu mobilnost u biljci i istovremeno visoku otpornost na ispiranje kišom, a pripada grupi inhibitora sukcinat dehidrogenaze (SDHI). Jednako je pouzdan u zaštiti listova i plodova.
- Sercadis® treba primijeniti prije cvatnje kako bi se na vrijeme suzbila pepelnica. Tretman poslije cvatnje, osim učinka na venturiju, ima i veliki značaj za suzbijanje alternarijske pjegavosti.
- U cilju zaštite od rezistencije preporučuje se kombinacija sa slijedećim preparatima: Delan® Pro, Delan® 700 WG, Polyram® DF ili Faban®.

BASF se intenzivno bavi problemima rezidua u plodovima.
Sercadis® potpuno odgovara suvremenim zahtjevima: primijenjen 2-3 puta u sezoni, a posljednji put 90 dana prije berbe, prema našim istraživanjima mogu se očekivati ostatci ispod nivoa detekcije.

Faban®

Prvi fungicid za suzbijanje čadave krastavosti sa Co-Crystal tehnologijom

PROFIL PROIZVODA

AKTIVNA TVAR:
250 g/l primetanil + 250 g/l ditianon

FORMULACIJA:
koncentrirana suspenzija (SC)

PRIMJENA:
čadava pjegavost lista i krastavost plodova jabuke i kruške (*Venturia inaequalis, Venturia pyrina*)

DOZA:
1,2 - 1,6 l/ha

NAČIN DJELOVANJA:
kontaktno, lokal-sistemično

BROJ PRSKANJA:
4 prskanja godišnje

KARENCA:
56 dana

PREPORUKA

- Faban® je fungicid izuzetnog preventivnog ali i kurativnog djelovanja
- Primijenjen u roku od 48 h od infektivne kiše može zaustaviti infekciju koja nastaje
- Za razliku od ostalih preparata koji sadrže primetanil, Faban® dobro djeluje i pri visim temperaturama
- Preporučujemo ga u periodima najsnažnijeg pritiska čadave krastavosti



Faban® je fleksibilan, može se primijeniti prije, za vrijeme i nakon cvatnje. Co-Crystal formulacija osigurava nisko isparavanje i brzo usvajanje. Djeluje pri nižim i visim temperaturama.

Delan® Pro

Proaktivna tehnologija

- Delan® Pro je inovativno rješenje u suzbijanju venturije jezgričastog voća
- Delan® Pro objedinjuje kontaktno i preventivno djelovanje dokazane aktivne tvari ditianon sa sistemičnim kretanjem kalijum-fosfita
- Nema opasnosti od rezistencije
- Posjeduje odličnu otpornost na ispiranje kišom

PROFIL PROIZVODA

AKTIVNA TVAR:
125 g/l ditianon + 561 g/l kalijum-fosfit

FORMULACIJA:
koncentrirana suspenzija (SC)

PRIMJENA:
čadava pjegavost lista i krastavost plodova jabuke i kruške (*Venturia inaequalis, Venturia pyrina*)

DOZA:
2,5 l/ha

NAČIN DJELOVANJA:
kontaktno i preventivno

PREPORUČENO VRIJEME UPORABE:
od faze zelenih vrhova cvjetnih pupoljaka (BBCH 53) do početka zriobe (BBCH 81)

BROJ PRSKANJA:
6 prskanja godišnje

KARENCA:
35 dana

PREPORUKA

- Delan® Pro je jedini fungicid koji, osim odličnog djelovanja na venturiju, podizanjem imuniteta bilje pomaže u borbi protiv drugih gljivičnih i bakterijskih bolesti.
- Period cvatnje je posebno osjetljiv, kako zbog pritiska gljivičnih tako i zbog pojave bakterijskih bolesti
- Zato preporučujemo bar dva tretmana fungicidom Delan® Pro, prije cvatnje, jer kalijum-fosfit postiže punu učinkovitost kada se primjeni znatno prije pojave bolesti
- Primjena Delan® Pro nakon cvatnje ima odličnu učinkovitost u zaštiti mladih, osjetljivih plodova

Primjena Delan® Pro prije cvatnje osigurava pouzdanu zaštitu od venturije i snažan imunitet

PROGRAM ZAŠTITE JABUKE

	Pucanje pupa	Mišje uši	Zeleni pup	Ružičasti pup	Početak cvatnje	Cvatnja	Završetak cvatnje	Formiranje plodova	Formiranje plodova	Kraj formiranja plodova	Zrioba
ČAĐAVA KRASTAVOST	**Polyram® DF*** 2,0 kg/ha	**Delan® Pro** 2,5 l/ha	**Delan® Pro** 2,5 l/ha	**Faban®** 1,2 l/ha	**Revyona®** 2 l/ha + **Delan® WDG** 0,5 kg/ha	**Sercadis®** 0,25 l/ha + **Delan® PRO** 2,5 l/ha	**Revyona®** 2 l/ha + **Delan® WDG** 0,5 kg/ha	**Sercadis®** 0,25 l/ha + **Delan® PRO** 2,5 l/ha	**Delan® WDG** 0,5 - 0,75 kg/ha		
PEPELNICA	**Chromosul® 80** 3,0-5,0 kg/ha		**Sercadis®** 0,25 l/ha + **Chromosul® 80** 3,0-5,0 kg/ha						**Chromosul® 80** 3,0-5,0 kg/ha		
REGULACIJA RASTA					**Regalis® Plus** maksimalno 3,0 kg/ha godišnje						
SKLADIŠNE BOLESTI											**Bellis®** 0,8 kg/ha
SUZBIJANJE KOROVA	**Stomp® Aqua** 3,0 l/ha										

* Napomena: Polyram® DF - dozvoljene tri naizmjenične primjene s istim ili fungicidima drugih kemijskih skupina (izvor: Zakon o održivoj uporabi pesticida)

Skenirajte QR code i pogledajte naše kanale:

BASF web stranica

BASF FB stranica

BASF YouTube kanal

BASF
We create chemistry