


Delan® Pro

Proaktivna tehnologija

- Delan® Pro je inovativno rješenje u suzbijanju venturije jezgričastog voća.
- Delan® Pro objedinjuje kontaktno i preventivno djelovanje dokazane aktivne tvari ditianon sa sistemčnim kretanjem kalijum-fosfita.
- Nema opasnosti od rezistencije.
- Posjeduje odličnu otpornost na ispiranje kišom.

Profil proizvoda

Aktivna tvar:	125 g/L ditianon +561 g/L kalijum-fosfit
Formulacija:	koncentrirana suspenzija (SC)
Primjena:	čadava pjegavost lista i krastavost plodova jabuke i kruške (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>)
Doza:	2,5 L/ha
Način djelovanja:	kontaktno i preventivno
Preporučeno vrijeme upotrebe:	od faze zelenih vrhova cvjetnih pupoljaka (BBCH 53) do početka zriobe (BBCH 81)
Broj prskanja:	6 prskanja godišnje
Karenca:	35 dana



Primjena Delan® Pro prije cvatnje osigurava pouzdanu zaštitu od venturije i snažan imunitet.



Preporuka

Delan® Pro je jedini fungicid koji, osim odličnog djelovanja na venturiju, podizanjem imuniteta biljke pomaže u borbi protiv drugih gljivičnih i bakterijskih bolesti.

Period cvatnje je posebno osjetljiv, kako zbog pritiska gljivičnih tako i zbog pojave bakterijskih bolesti.

Zato preporučujemo bar dva tretmana fungicidom Delan® Pro, prije cvatnje, jer kalijum-fosfit postiže punu učinkovitost kada se primjeni znatno prije pojave bolesti.

Primjena Delan® Pro nakon cvatnje ima odličnu učinkovitost u zaštiti mladih, osjetljivih plodova.

Faban®

Prvi fungicid za suzbijanje čadave krastavosti sa Co-Crystal tehnologijom

Profil proizvoda

Aktivna tvar:	250 g/L pirimetanil + 250 g/L ditianon
Formulacija:	koncentrirana suspenzija (SC)
Primjena:	čadava pjegavost lista i krastavost plodova jabuke i kruške (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>)
Doza:	1,2 — 1,6 L/ha
Način djelovanja:	kontaktno, lokal-sistemično
Broj prskanja:	4 prskanja godišnje
Karenca:	56 dana



Preporuka

Faban® je fungicid izuzetnog preventivnog ali i kurativnog djelovanja.

Primijenjen u roku od 48 h od infektivne kiše može zaustaviti infekciju koja nastaje.

Za razliku od ostalih preparata koji sadrže pirimetanil, Faban® dobro djeluje i pri višim temperaturama. Preporučujemo ga u periodima naj snažnijeg pritiska čadave krastavosti.

Program zaštite jabuke 2026

BASF
We create chemistry

Program zaštite jabuke

BASF
We create chemistry



Pucanje pupa

Mišje uši

Zeleni pup

Ružičasti pup

Početak cvatnje

Cvatnja

Završetak cvatnje

Formiranje plodova

Formiranje plodova

Kraj formiranja

Zrioba

**ČAĐAVA
KRASTAVOST**

Delan® Pro
2,5 l/ha

Delan® Pro
2,5 l/ha
+
Sercadis®
0,25 l/ha
+
Chromosul® 80
4,0 kg/ha

Faban®
1,2 l/ha

Delan® 700 WDG
0,5 kg/ha
+
Revyona®
2,0 l/ha
+
Chromosul® 80
3,0 kg/ha

Delan® Pro
2,5 l/ha
+
Sercadis®
0,25 l/ha
+
Chromosul® 80
3,0 kg/ha

Delan® 700 WDG
0,5 kg/ha
+
Revyona®
2,0 l/ha
+
Chromosul® 80
3,0 kg/ha

Delan® Pro
2,5 l/ha
+
Sercadis®
0,25 l/ha
+
Chromosul® 80
3,0 kg/ha

Delan® 700 WDG
0,5 kg/ha

PEPELNICA

Chromosul® 80
5,0–6,0 kg/ha

Chromosul® 80
4,0 kg/ha

Chromosul® 80
4,0 kg/ha

Chromosul® 80
3,0 kg/ha

Chromosul® 80
3,0 kg/ha

Chromosul® 80
3,0 kg/ha

Chromosul® 80
3,0 kg/ha

Chromosul® 80
4,0 kg/ha

**REGULACIJA
RASTA**

Regalis® Plus
maksimalno 3,0 kg/ha godišnje

**SKLADIŠNE
BOLESTI**

Bellis® 80
0,8 kg/ha

**SUZBIJANJE
KOROVA**

Stomp® Aqua
2,5–2,6 l/ha

Napomene:

Količinu sredstva Chromosul® 80 prilagoditi razdoblju vegetacije, pritisku bolesti i osjetljivosti sorte. Ukupna količina aktivne tvari ditianon na jabuci i krušci ne smije prelaziti 2625 g ditianona /ha u jednoj vegetacijskoj sezoni zbog rizika od prekoračenja MDK vrijednosti.

**Skenirajte QR kod
i pogledajte naše kanale:**



BASF
Web
stranica



BASF
Facebook
stranica



BASF
YouTube
kanal

BASF FUNGICIDI ZA ZAŠTITU JABUKE

Nezaobilazni dio svakog programa

Promjene uvjeta proizvodnje kojima su biljke izložene – traže reakciju proizvođača. Zahtjevi tržišta koje uglavnom određuju konzumenti i trgovci jabukom, prenose se na proizvođača ali i na potrebu promjene dosadašnjih proizvodnih praksi. Podizanjem intenzivnosti ostvaruju veći prinos i količinu plodova prve klase u kontinuitetu. Sve osim prve klase posljednjih godina uglavnom ima nisku tržišnu vrijednost. U ovako uspostavljenom sistemu i najmanja greška može dovesti do velikih šteta.

Zabranom primjene pojedinih aktivnih tvari, BASF postaje nezaobilazni partner u kreiranju programa zaštite plodovitog voća, počevši s fungicidima koji su sinonim za uspješnu proizvodnju: **Delan® WDG** i **Delan® Pro**.

Pozitivan utjecaj na imuni sistem biljke, vrhunski učinak kod ostvarenih infekcija te bez prisutne rezistencije, prednosti su BASF fungicida: **Faban®**, **Revyona®**, **Sercadis®** i **Bellis®**.



BASF se aktivno prilagođava novonastalim uvjetima proizvodnje, razvojem novih proizvoda i kreiranjem novih trendova kojim će zadovoljiti i najstrože zahtjeve tržišta.

Revyona® Bolja i drugačija


- **JEDNO** rješenje za **TRI** najvažnije bolesti jabuke: čađava krastavost lista i ploda, pepelnica i alternarijska pjegavost.
- Učinkovit i na otporne sojeve čađave krastavosti.
- Djeluje preventivno i kurativno.

Profil proizvoda

Aktivna tvar:	75 g/L Revysol®
Formulacija:	koncentrat za suspenziju (SC)
Primjena:	čađava pjegavost lista i krastavost ploda (<i>Venturia</i> sp.), pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>), smeđa pjegavost kruške (<i>Stemphylium</i> sp.), pjegavost lista jabuke (<i>Alternaria mali</i>)
Doza:	2,0 L/ha
Način djelovanja:	2x jabuka, kruška
Karenca:	28 dana



Za zaštitu jabuke od čađave krastavosti, pepelnice i alternarijske pjegavosti Revyona® je najbolje primijeniti od faze ružičastog pupa do kraja formiranja plodova u dozi 2,0 L/ha.



Faban® Nezamijenjiv dio slagalice

- Sercadis® je fungicid širokog spektra djelovanja za sigurnu zaštitu od pepelnice i čađave krastavosti u jezgričavom voću.
- Jednako je pouzdan u zaštiti listova i plodova.
- Sercadis® treba primijeniti prije cvatnje kako bi se na vrijeme suzbila pepelnica. Tretman poslije cvatnje, osim učinka na venturiju, ima i veliki značaj za suzbijanje alternarijske pjegavosti.
- U cilju zaštite od rezistencije preporučuje se kombinacija sa slijedećim preparatima: Delan® Pro, Delan® 700 WDG ili Faban®.

Profil proizvoda

Aktivna tvar:	300 g/L Xemium®
Formulacija:	koncentrirana suspenzija (SC)
Primjena:	pepelnica jabuke (<i>Podosphaera leucotricha</i>), čađava krastavost jabuke (<i>Venturia inaequalis</i>) i čađava krastavost kruške (<i>Venturia pyrina</i>)
Doza:	0,25 L/ha jabuka i kruška
Način djelovanja:	sistemično
Preporučeno vrijeme uporabe:	jabuka: od faze zelenog pupa (BBCH 53) do početka zriobe (BBCH 81)
Broj prskanja:	3 prskanja godišnje
Karenca:	35 dana za jabuku i krušku

